

# ПРИВИВКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ЗАЩИЩАЕТ РЕБЕНКА ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ



Подготовка человека к борьбе с туберкулезом начинается с первых дней жизни. Ребенок получает прививку против туберкулеза в роддоме, на 3-7 день жизни вакциной, которая называется БЦЖ. В настоящее время для вакцинации детей в родильном доме используется ослабленная вакцина, которая называется БЦЖ-М.

Вакцина вводится строго внутривенно на границе верхней и средней трети левого плеча.

На месте внутривенного введения вакцины развивается специфическая реакция в виде папулы размером 5-10 мм в диаметре через 4-6 недель. Затем образуется пустула (уплотнение с нагноением в центре) к 3-м месяцам, корочка к 6 месяцам, а к 1 году рубчик.



## **Свидетельством качественной вакцинации является четкий рубчик на месте введения вакцины**

Вакцинация против туберкулеза очень важна в профилактике тяжелых форм туберкулеза у детей, таких как туберкулезный менингит, милиарный туберкулез, которые порой приводят к инвалидности ребенка.

Привитые дети более устойчивы к заражению туберкулезом, а при заболевании процесс протекает без тяжелых осложнений, **поэтому от прививки БЦЖ родителям отказываться нельзя.**